



## ~~Niet~~ Wel op z'n achterhoofd gevallen...

Heeft u een leerling die zich plotseling anders of vreemd gedraagt?

Er is mogelijk sprake van hersenletsel... Vul de signaleringslijst in!

Naam leerling \_\_\_\_\_

Invuldatum \_\_\_\_\_

**Hieronder staat de top twaalf van signalen die duiden op hersenletsel, veroorzaakt door een val of klap op het hoofd of door een hersenziekte in de jeugd. Welke van de signalen zijn van toepassing op de leerling?**

- Problemen met aandacht en geheugen
- Moeite met verwerking/vertraagde verwerking van nieuwe informatie
- Gebrek aan impulsbeheersing
- Initiatiefloosheid
- Snel geïrriteerd, kort lontje
- Niet in staat zijn tot multitasking
- Moeheid, hoofdpijn
- Zelfoverschatting; eigen gedrag niet goed kunnen beoordelen
- Stemmingwisselingen
- Opdrachten niet begrijpen/niet kunnen uitvoeren
- Woordgrapjes/figuurlijke taal niet goed begrijpen
- Verandering in sociale contacten

Hoe meer signalen er van toepassing zijn op de leerling, hoe groter de kans op hersenletsel. Als u tenminste 6 van de 12 vragen aan hebt gekruist, is er mogelijk sprake van NAH. Als er veel zorgen zijn over één of enkele signalen, kan er ook hersenletsel spelen.

Bij hersenletsel treden de symptomen vaak plotseling op. Het kan echter ook voorkomen, dat naarmate een kind ouder wordt en men complexere taken van het kind verwacht, symptomen sterker worden.

U kunt hier terecht voor meer informatie, advies en ondersteuning:

- [Netwerk Ziezon](#); het landelijk expertisenetwerk voor ziek zijn & onderwijs.  
[Ga naar Netwerk Ziezon >>](#)
- [Hersenletsel Netwerk Noord](#); een regionaal netwerk van professionals en ervaringsdeskundigen gespecialiseerd in hersenletsel.  
[Ga naar Hersenletsel Netwerk Noord >>](#)

